

PARODONTAL

# ASEPTA®



длительная фиксация на десне



ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ВОСПАЛЕНИЯ  
И КРОВОТОЧИВОСТИ ДЁСЕН

# БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЁСЕН АДГЕЗИВНЫЙ, 10 г

Комбинированное средство локального действия, применяется при воспалении и кровоточивости дёсен

**Эффективная комбинация «хлоргексидин + метронидазол» оказывает быстрый результат**



**Метронидазол** 0,8% (8 мг/г – 0,8 г в 100 г продукта) воздействует на аэробные и анаэробные бактерии, которые являются одной из причин гингивита, пародонтита, стоматита, периимплантита.



**Хлоргексидина биглюконат** 0,1% (1 мг/г – 0,1 г в 100 г продукта) имеет широкий спектр антибактериального действия, активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.



**Масло мяты и ментол** успокаивают воспалённую слизистую и освежают полость рта.


## От 75 минут

Время фиксации средства на десне\*\*

Длительное время воздействия активных компонентов

Адгезивная основа из пектина и карбоксиметилцеллюлозы обеспечивает плотное прилегание к десне

- Уменьшает воспаление и кровоточивость
- Обладает антисептическим и противомикробным свойствами
- Снижает болевые ощущения



Курс 7-10 дней



# ГЕЛЬ ДЛЯ ДЁСЕН С ПРОПОЛИСОМ, 10 г

Применяется при воспалительных процессах, микрповреждениях слизистой оболочки полости рта и повышенной чувствительности дёсен\*. Рекомендуются в том числе при использовании съёмных протезов, брекет-систем, после наложения швов.



**Прополис** 10% обладает противовоспалительным, противомикробным, противо-зудным и анестезирующим свойствами.

Его высокая концентрация позволяет ускорить регенерацию и эпителизацию раневых поверхностей, стимулирует метаболические процессы.


## На 81%

увеличивает эффективность лечения  
травматического стоматита\*\*

- Предотвращает воспаление и кровоточивость дёсен
- Восстанавливает микрофлору полости рта
- Снижает повышенную чувствительность дёсен
- Ускоряет процессы заживления

\*Повышенная чувствительность десны – это состояние, при котором дёсны становятся чрезмерно чувствительными и реагируют на раздражители, которые обычно не вызывают дискомфорта.

\*\*Доказано клиническими исследованиями



# ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА ACTIVE, 250 мл

Применяется при воспалении и кровоточивости, повышенной чувствительности дёсен\*

**Эффективная комбинация «хлоргексидин + бензидамин» оказывает противомикробное и противовоспалительное действие**



**Бензидамин** 0,15% обладает антимикробной активностью, снижает болевые ощущения, стимулирует процессы заживления. Благодаря бензидамину, обладает лёгким анестезирующим действием.



**Хлоргексидин** 0,05% имеет широкий спектр антибактериального действия, активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.




**Мята и ментол** способствуют укреплению дёсен и освежают полость рта.

## На 43%


снижает кровоточивость  
дёсен\*\*

- Уменьшает воспаление и кровоточивость дёсен
- Оказывает антибактериальное действие
- Оказывает лёгкий анестезирующий эффект



# Когда применять Бальзам для дёсен адгезивный, а когда Гель с прополисом?

## БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЁСЕН АДГЕЗИВНЫЙ



Форма: бальзам на адгезивной основе

### ПОКАЗАНИЯ:


- Острая форма гингивита и пародонтита, а также обострение хронических форм
- После хирургического вмешательства, в том числе после удаления зубов
- При бактериальных поражениях слизистой оболочки рта, в том числе при присоединении вторичной инфекции при травматических и эрозивно-язвенных поражениях
- В составе пародонтальной повязки после открытого/закрытого кюретажа
- Аппликации после снятия зубных отложений
- Афтозный стоматит

Бальзам адгезивный ASEPTA® эффективен против широкого спектра возбудителей заболеваний полости рта.

При воспалении (отек, гиперемия, болезненность всех отделов десны), кровоточивости десен, неприятном запахе изо рта.

Бальзам содержит хлоргексидин и метронидазол, поэтому не следует применять его более 10 дней подряд, чтобы не нарушать микробиологический климат полости рта.

## ГЕЛЬ ДЛЯ ДЁСЕН С ПРОПОЛИСОМ



Форма: гель

### ПОКАЗАНИЯ:

- Гингивит и пародонтит в стадии ремиссии
- Мукозит, периимплантит
- При травматических поражениях слизистой оболочки рта
- При использовании съёмных и несъёмных ортопедических и ортодонтических конструкций в полости рта
- Глоссит
- Хейлит
- Стоматит

Рекомендовано применять после использования адгезивного бальзама ASEPTA® для снятия остаточных явлений воспаления.

Для восстановления микрофлоры полости рта после применения средств с выраженным противомикробным действием.

Профилактика пародонтита и гингивита для предупреждения рецидива.

Использовать 2 раза в год.

## ЗУБНАЯ ПАСТА ACTIVE, 75 мл



На **69%**

снижает кровоточивость дёсен\*

Низкоабразивная зубная паста для гигиены полости рта при воспалении и кровоточивости дёсен.

Без содержания лаурилсульфата натрия, антисептиков и фторидов

## ЗУБНАЯ ПАСТА ВІОСМРЕХ, 75 мл



На **66%**

уменьшение воспаления дёсен\*

7 активных компонентов для комплексного ухода и профилактики заболеваний дёсен и зубов!



Все средства ASEPTA® одобрены Центральным научно-исследовательским институтом стоматологии и челюстно-лицевой хирургии



asepta.ru

АО «Вертекс», 199106, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 24 линия, д. 27, лит. А. Горячая линия: 8 (800) 200-03-05

\*Доказано клиническими исследованиями

**ВЕРТЕКС**  
фармацевтическая компания